

مرجع سريع يُعلق على جدار غرفة العلاج. يجب فحص كل عميلة في كل مرة. عند الشك، يُؤجل العلاج.

إزالة الشعر بالشمع	IPL / ليزر	العناية بالوجه والتقشير	الرموش والحواجب
لا يُجرى العلاج	جلد مجروح أو حروق شمس أو عدوى نشطة أو قرحة برد في المنطقة	الحمل (معظم الأجهزة)، أو اسمرار أو حروق شمس حديثة، أو صرع يحفز الضوء	الحمل (التقشير)، أو قرحة برد أو عدوى نشطة، أو حروق شمس، أو جروح مفتوحة
التأجيل وإعادة الحجز	ريتينيويديات أو أحماض أو تقشير على المنطقة (الفاصل الزمني حسب الطبيب أو المنتج)	إزالة الشعر بالشمع أو النتف خلال آخر 4 أسابيع، أو التسمير الذاتي، أو أدوية تزيد الحساسية للضوء	إزالة شعر بالشمع أو ليزر أو حقن أو ريتينيويديات على الوجه مؤخرًا
توخي عناية إضافية	السكري، الحمل، الدوالي، سهولة ظهور الكدمات، البشرة شديدة الحساسية	Fitzpatrick IV فما فوق، وشوم أو شامات في المنطقة، تاريخ من الجذرة	الوردية، الإكزيما، البشرة الحساسة، تاريخ من التصبغات
الإحالة إلى الطبيب	أي كتلة أو تورم أو تغير في الجلد (بما في ذلك الإبط)	شامات متغيرة أو آفات غير مبررة	اشتباه في عدوى أو تفاعل يزداد سوءًا
			تورم أو ألم حول العين لا يزول

دائمًا: استشارة وموافقة خطيتان، واختبار حساسية عندما يتطلب المنتج أو الجهاز، وتعليمات عناية لاحقة واضحة. لا تقوم الأخصائية بالتشخيص. يجب وصف ما تلاحظه، والاعتذار عن تقديم العلاج، ونصح العميلة بطلب استشارة طبية.

استمارات استشارة وموافقة وأوراق عناية لاحقة كاملة وقابلة للتعديل: templates.demurestudioacademy.digital